


CÓMO RETIRAR CORRECTAMENTE UNA GARRAPATA


1

Coloca la garrapata de forma perpendicular al cuerpo del paciente




2

Coloca las pinzas lo más cercano posible al cuerpo del paciente



3

Tira con suavidad hacia arriba y en forma recta, para que salga completo el animal



EQUIPO TÉCNICO E INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Dra. Ingeborg Becker Fauser
Facultad de Medicina, UNAM



Dr. Pablo Colunga Salas
INBIOTECA, UV



Universidad Veracruzana



Colaboración:

Dip. Esteban Bautista Hernández
Presidente de la Junta de Coordinación
Política de la LXVII Legislatura del
H. Congreso del Estado de Veracruz.

Más información:

pcolunga@uv.mx
becker@unam.mx

Para diagnósticos:

Centro de Medicina Tropical, Facultad
de Medicina. Hospital General de
México "Dr. Eduardo Liceaga"
tel: 55-5623-2674
email: cmt.fm@yahoo.com

Elaboración como parte del proyecto
CONAHCYT CF-2023-G-174

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR



BORRELIOSIS Y RICKETTSIOSIS

BORRELIOSIS

Enfermedad causada por especies bacterianas del género *Borrelia*.

En zonas tropicales puede ser mortal al presentarse cuadros febriles que se presentan en ciclos (de 3-5 días de duración), separados por una semana, aproximadamente (Fiebre recurrente)

SÍNTOMAS



DIAGNÓSTICO

Gota gruesa en microscopio. De preferencia durante el episodio febril

TRATAMIENTO

Tetraciclina - 500 mg c/6h x 5 a 10 días
Doxiciclina - 100 mg c/8h x 5 a 10 días
Eritromicina - 500 mg c/6h x 5 a 10 días

RICKETTSIOSIS

Enfermedad causada por especies bacterianas del género *Rickettsia*.

Conocida como fiebre manchada, tifo epidémico o tifo murino, se caracterizan por erupciones, vasculitis o escaras. Puede comprometer las funciones del bazo, hígado e incluso complicaciones neurológicas. Puede derivar en la amputación de miembros, discapacidad mental o la muerte.

SÍNTOMAS



DIAGNÓSTICO

Anamnesis y examen físico
Puebas serológicas (NO útil en etapa aguda)
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

TRATAMIENTO

En caso de sospecha, administrar **Doxiciclina** en los pacientes de todas las edades, incluyendo infantiles y personas embarazadas

INDICACIONES GENERALES

1

Iniciar el tratamiento de inmediato en caso de sospecha de alguna de estas patologías



2

Dar seguimiento al paciente por al menos 2 semanas posteriores a la recuperación



3

Notificar a la dirección de epidemiología

